



POUČENÍ PO PROTETICKÉ PRÁCI

Po broušení zubů dochází k odstraňování tvrdé zubní tkáně, dostáváme se tedy blíže k zubní dřeni, která obsahuje nervy a tak typickým příznakem je citlivost zubu, zejména na studené. Také jsou často pohmožděny i dásně, které se opět zregenerují.

Dodržujte:

Dodržujte správnou **dentální hygienu** - čistit 2 x denně, masírujte dásně měkkým kartáčkem i přes jejich citlivost po broušení

Vyplachujte 2x denně ústní vodou, která obsahuje látku chlorhexidin. Pomůže Vám měkké tkáně rychleji zahojit. Chlorhexidin nepoužívejte déle než 14 dní. Nelekejte se tmavšího zabarvení zubů po vyplachování, pigment odstraníme při další návštěvě u nás.

V případě obrovské bolesti, bránící spánku, nereagující na léky se prosím dostavte do naší ordinace. Jednou z komplikací broušení zubu může být zánět nervu, který je třeba endodonticky ošetřit tak, abyste po nasazení definitivní práce neměli potíže.

Při nasazení provizorní práce se nebojte lékaři sdělit svá přání a nároky, provizorní plastové práce slouží k modelaci měkkých tkání a zjištění, zda Vám zuby vyhovují funkčně i esteticky.

V případě dotazů či potíží zavolejte nejlépe v dopoledních hodinách na recepci: 771 177 955.

